



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

ALERTA: SARAMPIÓN



DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PREVENTIVA Y LABORAL

ÁREA DE PREVENCIÓN

¿Qué es el Sarampión?



- El sarampión es una enfermedad exantemática causada por el virus de sarampión, un virus de RNA, del género Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae.
- Es altamente contagioso, y se disemina por vía respiratoria, de una persona infectada a otra no inmune por medio de gotitas aerosolizadas de secreciones respiratorias.



Sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Infección viral grave en los niños pequeños, pero de fácil prevención mediante una vacuna.

► Diagnóstico médico

Análisis de laboratorio

► Tratamiento

Antifebriles (Acetaminofén)
Vitamina A / Analgésicos
pueden aliviar los síntomas

► Prevención

Jornadas de vacunación
La vacuna llamada trivalente viral, o SPR y SRP inmuniza al paciente. Previene el sarampión, parotiditis y la rubéola.

► Especialistas

Médico de atención primaria
Pediatra / Infectólogo

► Transmisión

Se transmite fácilmente mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar.



Infografía PRIMICIA / Lilia D'Sousa



► Afecciones



Dolor de cabeza



Conjuntivitis
Sensibilidad a la luz



Congestión nasal
estornudos



Tos seca



Dolor de garganta
Inflamación
ganglios linfáticos



Fiebre 38.5 a 40.5°



Malestar, fatiga
Pérdida de apetito



Dolor muscular,
todo el cuerpo



Diarrea

► Afecciones



Neumonía



Encefalitis

¿ Cuáles son los síntomas?



- Fiebre alta
- Secreción nasal, conjuntivitis y tos
- Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla
- Erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo

SE CONTAGIA DE PERSONA A PERSONA

Primeros síntomas

Fiebre alta

Conjuntivitis


Aparecen manchas en la boca antes del sarpullido en el cuerpo.

Las secreciones nasales son esparcidas a través del estornudo o al hablar.

Tos seca

Pérdida del apetito

Aparición de sarpullido



¿Cómo se previene?

- La vacuna Triple Viral SRP es efectiva en la prevención del sarampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

El Estado Nacional garantiza **VACUNAS GRATUITAS** en centros de salud y hospitales públicos de todo el país

Vacunas	BCG (1)	Hepatitis B HB (2)	Neumococo Conjugada (3)	Quintuple Pentavalente DTP-Hib-Hib (4)	Polio IPV (5) OPV (6)	Rotavirus (7)	Meningococo (8)	Gripe (9)	Hepatitis A (10)	Triple Viral SRP (11)	Varicela (12)	Cuádruple o Quintuple Pentavalente DTP-Hib (13)	Triple Bacteriana Celular DTP (14)	Triple Bacteriana Acelular dTpa (15)	Virus Papiloma Humano VPH (16)	Doble Bacteriana dT (17)	Doble Viral SA o Triple Viral SRP (18)	Fiebre Amarilla FA (19)	Fiebre Hemorrágica Argentina FHA (20)
Edad	única dosis (A)	dosis neonatal (B)																	
Recién nacido																			
2 meses			1° dosis	1° dosis	1° dosis		1° dosis (D)												
3 meses							1° dosis												
4 meses			2° dosis	2° dosis	2° dosis		2° dosis (E)												
5 meses							2° dosis												
6 meses				3° dosis	3° dosis														
12 meses			refuerzo						única dosis	1° dosis									
15 meses											única dosis								
15-18 meses					1° refuerzo					dosis anual (F)		1° refuerzo							
18 meses																		1° dosis (I)	
24 meses																			
5-6 años (ingreso escolar)					2° refuerzo					2° dosis		2° refuerzo		refuerzo	2 dosis (N)			refuerzo (M)	
11 años							única dosis												
A partir de los 15 años										iniciar o completar esquema (J)									única dosis (N)
Adultos																refuerzo cada 10 años	iniciar o completar esquema (I)		
Embarazadas								una dosis (G)						una dosis (J)					
Puerperio								una dosis (H)											
Personal de salud										iniciar o completar esquema (I)				una dosis (K)			iniciar o completar esquema (I)		

(1) BCG: Tuberculosis (fórmula inactiva)

(2) HB: Hepatitis B

(3) Previne la Meningitis, Neumonía y Sepsis por Neumococo

(4) DTP-HB-Hib (Pentavalente) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, Hemophilus Influenza b.

(5) IPV: (ScR) Poliovirus inactivado.

(6) OPV: (ScR) Poliovirus oral.

(7) Rotavirus

(8) Meningococo

(9) Antigripal

(10) HA: Hepatitis A

(11) SRP: (Triple viral) Sarampión, Rubéola, Póscar.

(12) Varicela

(13) DTP-Hib (Cuádruple) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa,

Hemophilus influenza b.

(14) DTP: (Triple Bacteriana Celular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.

(15) dTpa: (Triple Bacteriana Acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.

(16) VPH: Virus Papiloma Humano.

(17) dT (Doble Bacteriana) Difteria, Tétanos.

(18) SR: (Doble Viral) Sarampión, Rubéola.

(19) FA: (Fiebre Amarilla)

(20) FHA: (Fiebre Hemorrágica Argentina)

(A) Antes de egresar de la maternidad.

(B) En los primeros 12 meses de vida.

(C) Vacunación Universal: Si no hubiera recibido el esquema completo, deberá completarlo.

(D) En caso de tener que iniciar: aplicar 1° dosis, 2° dosis al mes de la primera y 3° dosis a los seis meses de la primera.

(E) La 1° dosis debe administrarse antes de los cuatro meses y seis días a tres meses y medio.

(F) La 2° dosis debe administrarse antes de las veintinueve semanas o los seis meses de vida.

(G) Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacuna separadas al menos por cuatro semanas.

(H) En cada embarazo deberán recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación.

(I) Parturientes deberán recibir vacuna antigripal si no la hubieran recibido durante el embarazo, antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de diez días después del parto.

(J) Si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral, después del año de vida para los nacidos después de 1965.

(K) Aplicar dTpa en cada embarazo independientemente del tiempo desde la dosis previa. Aplicar a partir de la semana 20 de gestación.

(L) Personal de salud que existe momento de 12 meses. Revacunar cada 5 años.

(M) Residentes en zonas de riesgo.

(N) Residentes en zona de riesgo única refuerzo a los diez años de la primera dosis.

(O) Residentes a trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hayan recibido anteriormente la vacuna.

(P) 2 dosis separadas por intervalo mínimo de 6 meses.

Para más información:

0-800-222-1002 salud.gov.ar

COBERTURA
de SALUD

Ministerio de Salud
de la Nación

07/08/2018

¿Cómo se previene?



- De 12 meses a 5 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna Triple Viral SRP (sarampión-rubéola-paperas).
- Mayores de 5 años, incluidos los adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con Doble Viral SP o Triple Viral SRP.

Características

Sarampión	Parotiditis	Rubéola
• Fam. paramixoviridae • Exantema maculopapular • Periodo catarral • 14 días aprox • COMPLICACIONES • Otitis 1/2 • Neumonía • Encefalitis • (extremo de la vida o inmunocomprometidos)	• Afecta sobre todo niños 2 a 9 años • Crecimiento parotideo 10 días • COMPLICACIONES raras • Pancreatitis • Encefalitis	• Producida por un virus ARN • Distribución mundial • Evolución benigna

Games, Juan. "INMUNIZACIONES EN PEDIATRÍA." n a la a. 8a. ed. xico: ndez Editores, 2013. p 149. Impreso..

¿Cómo se previene?



- Las personas nacidas antes de 1965 NO necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.
- Todo el personal de salud debe acreditar dos dosis de vacuna Doble Viral SP o Triple Viral SRP para estar adecuadamente protegido.



¿ Cómo se previene?



- “Dosis de contingencia”: Desde esta semana empezará a aplicarse en bebés de entre seis y once meses en CABA y en la sexta región de la Provincia para prevenir nuevos casos de sarampión.

A graphic with a dark background. In the center, there is a photograph of a doctor's hands in white gloves administering a vaccine into a baby's arm. The doctor is wearing a white coat and a stethoscope. The text "SARAMPIÓN" is written in large, bold, white capital letters, and "6 y 11 meses" is written in bold, white lowercase letters below it.

SARAMPIÓN
6 y 11 meses

Darán a bebés de esta edad una dosis extraordinaria de la vacuna contra el sarampión a modo preventivo. No afecta al Calendario Nacional de Vacunación.

¿Cómo se previene?



El Ministerio de Salud de la Nación indica contar con esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación:

- De 12 meses a 5 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).
- Mayores de 5 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna doble o triple viral.





MUCHAS GRACIAS!!



y vacune a sus hijos...